

Resumen Actualizado sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Este documento resume las actualizaciones recientes en torno al Trastorno del Espectro Autista (TEA), con base en los criterios diagnósticos del DSM-5 y CIE-11, junto con los avances científicos más relevantes al 2025.

Criterios Diagnósticos del DSM-5

El DSM-5 establece que el diagnóstico de TEA se basa en dos grandes grupos de síntomas:

- A. Déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en múltiples contextos.
- B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Criterios Diagnósticos según la CIE-11 (OMS)

La CIE-11 unifica los subtipos anteriores bajo la denominación “Trastorno del Espectro del Autismo”, destacando dos dimensiones clave:

- Dificultades en la interacción social recíproca.
- Comportamientos restringidos y repetitivos.

Tabla Comparativa: DSM-5 vs. CIE-11

Dimensión	DSM-5	CIE-11
Interacción social	Déficits en comunicación e interacción social	Dificultades en la interacción recíproca
Conductas repetitivas	Conductas e intereses restringidos y repetitivos	Conductas estereotipadas o repetitivas

Inicio	Antes de los 3 años, aunque se puede diagnosticar más tarde	Se reconoce manifestación en la infancia
--------	---	--

Avances Científicos Recientes

Algunas investigaciones destacadas hasta el 2025 incluyen:

- Estudio genético sobre la proteína CPEB4 implicada en el 80% de los casos.
- Asociación prenatal a contaminantes como pesticidas y microplásticos.
- Herramientas de inteligencia artificial para detección a los 9 meses.

6. Gráfico: Avances científicos por área

